


Arilin[®] rapid

1000 mg globulki, Metronidazolum

KRÓTKA TERAPIA

w nieswoistym bakteryjnym zapaleniu pochwy
nawet w ciężkich i nawracających zakażeniach¹



Arilin[®] rapid

1000 mg globulki, *Metronidazol*



krótka terapia – maksymalnie 2 dni¹

W pierwotnych zakażeniach wystarcza podanie jednej globulki Arilin rapid (1000 mg metronidazolu).
W ciężkich i nawracających zakażeniach zaleca się kurację dwudniową (po 1 globulce przez dwa dni).



wysoka dawka – 1000 mg metronidazolu

Jedyny lek na rynku w formie globulki dopochwowej zawierający metronidazol w dawce 1000 mg.²



wygodne podanie – dopochwowe, bez aplikatora

Globulki torpedowatego kształtu.¹

Mniej zdarzeń niepożądanych po krótkotrwałym,
dopochwowym podaniu metronidazolu w porównaniu z podaniem doustnym.³

Arilin rapid (*Metronidazolium*), globulki dopochwowe **Skład:** 1 globulka zawiera metronidazol 1000 mg **Wskazania do stosowania:** rzęsistkowica lub nieswoiste bakteryjne zapalenie pochwy **Dawkowanie i sposób podawania:** głęboko dopochwowo, najlepiej na noc; w pierwotnych zakażeniach: jednorazowo 1 globulka (1000 mg); w ciężkich i nawracających zakażeniach: 1 globulka (1000 mg) na dobę przez 2 dni **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na metronidazol, inne pochodne 5-nitroimidazolu, soję, orzeszki ziemne lub którąkolwiek subst. pomocniczą **Ostrzeżenia i środki ostrożności:** u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, zaburzeniami hemopoezy, chorobami ośrodkowego lub obwodowego ukł. nerwowego przed zastosowaniem leku należy szczególnie rozważyć ryzyko w stosunku do ewentualnych korzyści. Po rozpoczęciu ogólnoustrojowego leczenia metronidazolem u pacjentów z zespołem Cockayne'a, odnotowano przypadki ciężkiej hepatotoksyczności lub ostrej niewydolności wątroby, w tym o bardzo szybkim przebiegu, zakończone zgonem. W tej grupie pacjentów metronidazol można stosować jedynie po dokładnej analizie stosunku korzyści do ryzyka oraz jeśli alternatywne sposoby leczenia nie są dostępne. Podczas ogólnoustrojowego podawania metronidazolu odnotowano występowanie ciężkich, ostrych reakcji nadwrażliwości (np. wstrząsu anafilaktycznego), rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Metronidazolu i innych nitroimidazoli nie należy stosować dłużej niż przez 10 dni. Stosowanie Arilin rapid jednocześnie z produktami zawierającymi lateks (np. prezerwatywy, kapturki dopochwowe) może spowodować ich uszkodzenie i zmniejszyć skuteczność. **Działania niepożądane: bardzo często:** nudności, zapalenie żołądka, uczucie metalicznego smaku w jamie ustnej **często:** utrata apetytu, gorzki smak podczas odbijania się, nalot na języku, zapalenie języka, zapalenie bł. śluzowej jamy ustnej, wymioty, biegunka **niezbyt często:** zakażenia grzybicze (w okolicy narządów płciowych, leukopenia i granulocytopenia (należy przeprowadzać badania krwi podczas dłuższego podawania), reakcje anafilaktyczne, zaburzenia psychiatryczne, w tym omamy i stany splątania, pobudliwość, depresja, bóle i zawroty głowy, senność, bezsenność, ataksja, neuropatia obwodowa (odczuwanie drętwienia, zaburzenia czucia i mrowienia w kończynach) i drgawki, zaburzenia widzenia, zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz i stężenia bilirubiny we krwi), reakcje skórne (np. swędzenie, wykwit pokrzywkowy), osłabienie (mięśni), dyzuria, zapalenie pęcherza moczowego, nietrzymanie moczu, gorączka polekowa **bardzo rzadko:** agranulocytoza i trombocytopenia, ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny), reakcje alergiczne wywołane przez (3-sn-fosfatydylo)cholinę (z ziaren soi) – składnik zawartej w globulkach lecytyny, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zapalenie trzustki, bóle stawów **częstość nieznana:** encefalopatia, zespół mózdkowy (np. upośledzenie mowy, zaburzenia chodu, oczopląs i drgawki), zapalenie wątroby, niekiedy z żółtaczką, niewydolność wątroby (z koniecznością przeszczepu wątroby) u pacjentów leczonych jednocześnie innymi antybiotykami, ciężkie reakcje skórne [np. pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona), toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella), rumień wielopostaciowy] **Podmiot odpowiedzialny:** Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Sudbrackstrasse 56, 33611 Bielefeld, Niemcy **Pozwolenie nr:** 11024 wydane przez Prezesa URPL **Kategoria dostępności:** produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp Opracowano na podstawie ChPL 06.2019 r.

1. CHPL Arilin rapid 06.2019 2. Źródło: IQVIA 05.2020 3. M. Brandt, C. Abels, T. May, K. Lohmann, I. Schmidts-Winkler, U.B. Hoyme "Intravaginally applied metronidazole is as effective as orally applied in the treatment of bacterial vaginosis, but exhibits significantly less side effects", European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 141 (2008), 158-162.